

ไวรัสฮันตา

ภัยพหะจาก ‘หนู’

โรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus Disease)
เป็นโรคติดต่อจากกลุ่ม RNA ในตระกูล Hantaviridae
ซึ่งพบได้ในสัตว์ฟันแทะและสามารถติดต่อสู่คน
จนเป็นอันตรายถึงชีวิต

**ยังไม่พบ!!
การระบาด...
ในประเทศไทย**

อาการหลัก 2 กลุ่ม

ระยะฟักตัว 1-8 สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่มีมีอาการภายใน 1-2 สัปดาห์

1 กลุ่มอาการทางไต (HFRS)

พบมาก : เอเชีย และยุโรป

อาการ : ไข้สูง ปวดศีรษะ
จุดเลือดออกใต้ผิวหนัง
และอาจมีไตวายเฉียบพลัน

2 กลุ่มอาการทางปอด (HPS)

พบมาก : อเมริกา

อาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง
น้ำท่วมปอด หายใจลำบาก
(อันตรายถึงชีวิต)

การติดต่อ

สูดดมฝุ่นละออง
ที่มีปัสสาวะ อุจจาระ
หรือน้ำลายหนูที่แห้งแล้วฟุ้งกระจาย

สัมผัสสารคัดหลั่งหนู
แล้วยี่ตา จูบ ปาก

กินอาหาร ที่ปนเปื้อน
หรือถูกหนูที่มีเชื้อกัด (พบได้น้อย)

วิธีการป้องกัน

เก็บอาหารให้มิดชิด

จัดบ้านให้สะอาด

อย่าสัมผัส!! สารคัดหลั่งของหนู

เช่น ชีหนู , น้ำลายหนู ด้วยมือเปล่า

ขั้นตอนการทำความสะอาด

- สวมถุงมือ และหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
- หลีกเลี่ยงการกวาดแห้งหรือดูดฝุ่น
ที่ทำให้ฝุ่นกระจาย
- พรมน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
น้ำยาอีกผ้าขาว หรือน้ำผสมผงซักฟอกอีกครั้ง

แหล่งข้อมูล: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค